

- ▶ कोळी नियंत्रणासाठी डायमाईट २.५ मिली किंवा इथिऑन २.५ मिली + थायोव्हीट ०.५ ग्रॅम/ली. पाण्यातून अलटून पलटून फवारणी घ्यावी.
- ▶ मिरचीतील फळकूज व कांडी करपा कमी करण्यासाठी खालील फवारणी १५ दिवसाच्या अंतराने ३-४ वेळा घ्यावी.
- पाणी १०० ली + एस.आर.पी. २०० ग्रॅम + स्ट्रेप्टोसायक्लीन -२ पुड्या + ब्लुफोर २५० ग्रॅम + सी.बी.झेड -५०-१०० ग्रॅम
- ▶ पिकावरील झिक व फेरसची कमतरता भरून काढण्यासाठी झिंग व फेरो-चिल यांचा वापर ड्रीपमधून एकरी १ किलो याप्रमाणात करावा किंवा फवारणीसाठी ०.५ ग्रॅम प्रति ली. याप्रमाणात वापरावे.
- ▶ मिरचीची तोडणी / तोडे सुरु झाल्यानंतर ००:५२:३४ -२ ग्रॅम +सि.बी.झेड-५० : १ ग्रॅम + शुगर-फास्ट २ मिली याप्रमाणात फवारणी घेतल्यास वजन वाढते तसेच चकाकी व टिकवण क्षमतेत वाढ होते व त्यामुळे बाजारात मागणी व दर वाढतो.
- ▶ भुरी व करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी तसेच कांडी करपा रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली + सु-मॅक २०० मिली

(सदरच्या फवारणीमुळे चिटोसान स्वरूपात असलेले ऑर्गॅनिक कॅल्शियम मिळाल्यामुळे मिरचीचे वजन वाढते तसेच फूल व फळगळ कमी होते. व रोग व किडींचे प्रमाण आटोक्यात येते.

टीप : माती परिक्षण अहवालानुसार सदरच्या खत नियोजनामध्ये बदल करू शकता तसेच सेंद्रीय कर्ब वाढविण्यासाठी पेंडी व शेणखताचा वापर करावा.



The Company Growing with Grower...
U.S.K. AGRO SCIENCES®

Office : Plot No. 8822, Behind Hotel Sai Prathana, Near Vitthal Mandir,
 Vishrambhag, Sangli-416 415 Tal. Miraj, Dist. Sangli (Maharashtra)

Phone : 0233- 2303655, 2304655

E-mail : uskagrosciences@yahoo.co.in, uskagro@uskagrosciences.com
 website : www.uskagrosciences.com

मिरची

● बीजप्रक्रिया :

- ▶ लागवडीपुर्वी २-३ ग्रॅम थायरम प्रति किलो बियाण्यास चोळावे. यामुळे बियाण्याद्वारे पसरणाऱ्या मर रोगापासून मिरचीचे संरक्षण होते.
- ▶ रोपवाटीकेत रोपांच्या वाढीसाठी व बुरशीजन्य रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी बी पेरतेवेळी प्रत्येक वाफ्यात शेणखत ५ किलो + समरूप १९:१९:१९-१ किलो + एस.आर.पी. - ९ : १ किलो + ह्युमिफोर - जी १ किलो + सि.बी.झेड-५० : १०० ग्रॅम मातीत मिसळावे.
- ▶ मिरचीची रोपे उगवून आल्यानंतर १०-१५ दिवसांनी प्रत्येक वाफ्यात ब्लूफोर २ ग्रॅम + सि. बी. झेड-५० : २ ग्रॅम प्रति ली. पाणी किंवा रामबाण २.५ मिली प्रति ली. पाणी याप्रमाणे आळवणी करावी (जमिनीतून व बियाण्याद्वारा पसरणारा मूळकूज रोग थांबविण्यासाठी)
- ▶ रोपे ३-४ आठवड्याची झाल्यानंतर सुदामा ०.५ मिली किंवा स्लोगन ०.४ ग्रॅम + अंबामेक्टीन ०.५ ग्रॅम प्रति ली. पाण्यातून फवारणी घ्यावी यामुळे फुलकिडे, तुडतुडे व पाढरी माशी या किडी तसेच बोकड्या (पर्णगुच्छ) या रोगापासून संरक्षण होते.
- ▶ मिरचीची लागण करतेवेळी रोपे खालील द्रावणात बुडविल्यास रोपांची वाढ जोमदार होते तसेच रोग व किडींना अटकाव होते.
- पाणी १०० ली. + सुदामा ५० मिली + ह्युमिफोर २०० मिली + सीबीझेड-५० : १५० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी ५० ग्रॅम

● खत व्यवस्थापन :

▶ सिमला / ढोबळी मिरची -

- ▶ लागणीच्या वेळी डिएपी ३ बॅग + एस.आर.पी.-९ : १ बॅग + गंधक १० किलो + सल्फेट ऑफ पोटॅश १ बॅग + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो प्रति एकर घावे.

- ▶ लागणीनंतर ३० दिवसांनी अमोनियम सल्फेट २ बॅग प्रति एकर घावे.
- ▶ लागणीनंतर ५० दिवसांनी अमोनियम सल्फेट १ बॅग + युरिया २५ किलो + एस.आर.पी.-९ : १ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + ह्युमिफोर-जी ५ किलो. प्रति एकर घावे.
- ▶ **मिरची (ज्वाला)-**
- ▶ लागणीच्या वेळी डिएपी २ बॅग + सल्फेट ऑफ पोटॅश १ बॅग + गंधक १० किलो + एस.आर.पी.-९ : १ बॅग + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो प्रति एकर घावे.
- ▶ लागणीनंतर ३० दिवसांनी डि.ए.पी. १ बॅग + अमोनियम सल्फेट २५ किलो + युरिया २५ किलो + एस.आर.पी. -९ : १ बॅग + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + ह्युमिफोर-जी ५ किलो प्रति एकर घावे.
- ▶ रोपांची लागण झाल्यानंतर ५-६ दिवसांनी ड्रिपमधून एकरी १ किलो रुटशार्इन + १ किलो थायोव्हीट घावे. यामुळे मूळांचा विकास होऊन पिकाची वाढ चांगली मिळते.

● आळवणी :

- ▶ मिरचीचे मर रोग किंवा रोपे कोलमडणे यापासून संरक्षण करण्यासाठी लागणीनंतर २५-३० दिवसांनी खालीलप्रमाणे ड्रेंचिंग / आळवणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली + पेनिट्रेटर २५० मिली + कोसाईड १२५ ग्रॅम किंवा कांपर-टॉप - ५० ग्रॅम + एस.आर.पी. २०० ग्रॅम + ब्लीचींग पावडर - २०० ग्रॅम
- ▶ वरिल ड्रेंचिंग नंतर १० ते १५ दिवसांनी खालील आळवणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली. + मोरचूद ३०० ग्रॅम + चुना ३०० ग्रॅम + एस.आर.पी. २०० ग्रॅम + ब्लीचींग पावडर २०० ग्रॅम

- ▶ रोपाची चांगली वाढ होण्यासाठी व रोग व किडींपासून संरक्षण होण्यासाठी ८-१० दिवसांच्या अंतराने खालील मिश्रणाच्या ३-४ फवारण्या घ्याव्यात.
- पाणी १० ली. + हंस २५ मिली + एस.आर.पी. २० ग्रॅम + सुदामा ५ मिली + सि. बी. झेड -५० : १० ग्रॅम
- ▶ सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.
- पाणी १० ली. + स्ट्रॉबेरी / स्प्रेवेल १० ग्रॅम + मेगा-मॅग ३ ग्रॅम + एम-४५ : २५ ग्रॅम
- ▶ मिरचीतील फळधारणा वाढविण्यासाठी तसेच फुलगळ कमी करण्यासाठी सुपरस्टार-९ : २ मिली प्रति ली पाण्यातून फवारणीसाठी वापरावे. तसेच तोडा सुरु झाल्यानंतर १५ दिवस अंतराने फवारण्या घ्याव्यात.
- ▶ फळांचा आकार व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १० ली + आयकॉन शार्इन १० मिली + समरूप १३:००:४५ : ३० ग्रॅम + टायकून⁺⁺ ३ मिली + सि.बी.झेड -५० : १० ग्रॅम
- ▶ ठिबक सिंचनातून सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी एकरी २ ली मॅक्सवेल -डि एफ किंवा २ किलो मॅक्सवेल-एस + मॅग्नेशियम सल्फेट ५ किलो याप्रमाणे प्रत्येक महिन्यास घावे.
- ▶ मिरचीतील लीफ कर्ल (चुरडा मुरडा) रोगाच्या नियंत्रणासाठी लागवडीनंतर २५-३० दिवसांनी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १० ली + एस.आर.पी. २० ग्रॅम + सुदामा ५ मिली किंवा स्लोगन ४ ग्रॅम ही फवारणी ४-५ वेळा १५ दिवसांच्या अंतराने घ्यावी.