



युएसके अँग्रो सायन्सेस



USK
AGRO
Sciences

मिर्ची पिक्क नियोजन

2025



Phone
+91 9168691570



Website
www.uskagrosciences.com





बीजप्रक्रिया :

- लागवडीपुर्वी २-३ ग्रॅम थायरम प्रति किलो बियाणास चोळावे. यामुळे बियाण्याद्वारे पसरणाऱ्या मर रोगापासून मिरचीचे संरक्षण होते.
- रोपवाटीकेत रोपांच्या वाढीसाठी व बुरशीजन्य रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी बी पेरतेवेळी प्रत्येक वाफ्यात शेणखत ५ किलो + समरूप १९:१९:१९- १ किलो + एस.आर.पी. ९ : १ किलो + ह्युमिफोर - जी १ किलो + सि.बी.झेड-५० : १०० ग्रॅम मातीत मिसळावे.
- मिरचीची रोपे उगवून आल्यानंतर १०-१५ दिवसांनी प्रत्येक वाफ्यात ब्लूफोर २ ग्रॅम + सि. बी. झेड-५० : २ ग्रॅम प्रति ली. पाणी किंवा रामबाण २.५ मिली प्रति ली. पाणी याप्रमाणे आळवणी करावी (जमिनीतून व बियाण्याद्वारा पसरणारा मूळकूज रोग थांबविण्यासाठी)
- रोपे ३-४ आठवड्याची झाल्यानंतर सुदामा ०.५ मिली किंवा स्लोगन ०.४ ग्रॅम + अॅबामेक्टीन ०.५ ग्रॅम प्रति ली. पाण्यातून फवारणी घ्यावी यामुळे फुलकिडे, तुडतुडे व पांढरी माशी या किडी तसेच बोकड्या (पर्णगुच्छ) या रोगापासून संरक्षण होते.
- मिरचीची लागण करतेवेळी रोपे खालील द्रावणात बुडविल्यास रोपांची वाढ जोमदार होते तसेच रोग व किडींना अटकाव होतो.
- पाणी १०० ली. + सुदामा ५० मिली + ह्युमिफोर २०० मिली + सीबीझेड-५० : १५० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी ५० ग्रॅम



खत व्यवस्थापन :

- **सिमला / ढोबळी मिरची -**
- लागणीच्या वेळी डिएपी ३ बॅग + एस.आर.पी.-९ : १ बॅग + गंधक १० किलो + सल्फेट ऑफ पोटॅश १ बॅग + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो प्रति एकर द्यावे.

- लागणीनंतर ३० दिवसांनी **अमोनियम सल्फेट** २ बॅग प्रति एकरी द्यावे.
- लागणीनंतर ५० दिवसांनी **अमोनियम सल्फेट** १ बॅग + **युरिया** २५ किलो + **एस.आर.पी.-९** : ९ किलो + **मॅक्सवेल-एस** ५ किलो + **ह्युमिफोर-जी** ५ किलो. प्रति एकर द्यावे.
- **मिरची (ज्वाला) -**
- लागणीच्या वेळी **डिएपी** २ बॅग + **सल्फेट ऑफ पोटॅश** १ बॅग + **गंधक** १० किलो + **एस.आर.पी.- ९** : १ बॅग + **मॅक्सवेल-एस** ५ किलो + **ह्युमिफोर- जी** १० किलो प्रति एकर द्यावे.
- लागणीनंतर ३० दिवसांनी **डि.ए.पी.** १ बॅग + **अमोनियम सल्फेट** २५ किलो + **युरिया** २५ किलो + **एस.आर.पी. -९** : १ बॅग + **मॅक्सवेल-एस** ५ किलो + **ह्युमिफोर-जी** ५ किलो प्रति एकर द्यावे.
- रोपांची लागण झाल्यानंतर ५-६ दिवसांनी **ट्रिपमधून** एकरी १ किलो **रुटशार्डन** + १ किलो **थायोव्हीट** द्यावे. यामुळे **मूळांचा विकास होऊन पिकाची वाढ चांगली** मिळते.

आळवणी :

- **मिरचीचे मर रोग किंवा रोपे कोलमडणे यापासून संरक्षण** करण्यासाठी लागणीनंतर २५-३० दिवसांनी खालीलप्रमाणे **ट्रेचिंग / आळवणी** घ्यावी.
- **पाणी** १०० ली + **पेनिट्रेटर** २५० मिली + **कोसाईड** १२५ ग्रॅम किंवा **कॉपर-टॉप** ५० ग्रॅम + **एस.आर.पी.** २०० ग्रॅम + **ब्लीचींग पावडर** – २०० ग्रॅम
- वरिल ट्रेचिंग नंतर १० ते १५ दिवसांनी खालील आळवणी घ्यावी.
- **पाणी** १०० ली. + **मोरचूद** ३०० ग्रॅम + **चुना** ३०० ग्रॅम + **एस.आर.पी.** २०० ग्रॅम + **ब्लीचींग पावडर** २०० ग्रॅम



- **रोपाची चांगली वाढ होण्यासाठी व रोग व किडींपासून संरक्षण** होण्यासाठी ८-१० दिवसांच्या अंतराने खालील मिश्रणाच्या ३-४ फवारण्या घ्याव्यात.
- पाणी १० ली. + हंस २५ मिली + एस.आर.पी. २० ग्रॅम + सुदामा ५ मिली + सि. बी. झेड-५०: १० ग्रॅम
- **सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.**
- पाणी १० ली. + स्ट्रॉबेरी / स्प्रेवेल १० ग्रॅम + मेगा-मॅग ३ ग्रॅम + एम-४५ : २५ ग्रॅम
- **मिरचीतील फळधारणा वाढविण्यासाठी तसेच फुलगळ कमी करण्यासाठी सुपरस्टार-९** : २ मिली प्रति ली पाण्यातून फवारणीसाठी वापरावे. तसेच तोडा सुरु झाल्यानंतर १५ दिवस अंतराने फवारण्या घ्याव्यात.
- **फळांचा आकार व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी खालील फवारणी घ्यावी.**
- पाणी १० ली + आयकॉन शार्डन १० मिली + समरूप १३:००:४५ : ३० ग्रॅम + टायकून ३ मिली + सि.बी. झेड - ५० : १० ग्रॅम
- ठिबक सिंचनातून सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी एकरी २ ली मॅक्सवेल डि एफ किंवा २ किलो मॅक्सवेल-एस + मॅग्नेशियम सल्फेट ५ किलो याप्रमाणात प्रत्येक महिन्यास द्यावे.
- **मिरचीतील लीफ कर्ल (चुरडा मुरडा) रोगाच्या नियंत्रणासाठी** लागवडीनंतर २५-३० दिवसांनी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १० ली + एस.आर.पी. २० ग्रॅम + सुदामा ५ मिली किंवा स्लोगन ४ ग्रॅम ही फवारणी ४-५ वेळा १५ दिवसांच्या अंतराने घ्यावी.



- **कोळी नियंत्रणासाठी डायमाईट** २.५ मिली किंवा **इथिऑन** २.५ मिली + **थायोव्हीट** ०.५ ग्रॅम/ली. पाण्यातून अलटून पलटून फवारणी घ्यावी.
- **मिरचीतील फळकूज व कांडी करपा कमी करण्यासाठी** खालील फवारणी १५ दिवसाच्या अंतराने ३-४ वेळा घ्यावी.
- **पाणी** १०० ली + **एस.आर.पी.** २०० ग्रॅम + **स्ट्रेप्टोसायक्लीन** - २ पुड्या + **ब्लुफोर** २५० ग्रॅम + **सी.बी. झेड-५०-१००** ग्रॅम
- **पिकावरील झिंग व फेरसची कमतरता भरून काढण्यासाठी झिंग व फेरो-चिल** यांचा वापर ड्रीपमधून एकरी १ किलो याप्रमाणात करावा किंवा फवारणीसाठी ०.५ ग्रॅम प्रति ली. याप्रमाणात वापरावे.
- मिरचीची तोडणी / तोडे सुरु झाल्यानंतर ००:५२:३४ - २ ग्रॅम **सि.बी.झेड-५०** : १ ग्रॅम + **शुगर-फास्ट** २ मिली याप्रमाणात फवारणी घेतल्यास **वजन वाढते तसेच चकाकी व टिकवण क्षमतेत वाढ होते** व त्यामुळे बाजारात मागणी व दर वाढतो.
- **भुरी व करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी तसेच कांडी करपा रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी** खालील फवारणी घ्यावी.
- **पाणी** १०० ली + **सु-मॅक** २०० मिली
- (सदरच्या फवारणीमुळे चिटोसान स्वरूपात असलेले ऑर्गॅनिक कॅल्शियम मिळाल्यामुळे **मिरचीचे वजन वाढते तसेच फूल व फळगळ कमी होते.** व रोग व किडींचे प्रमाण आटोक्यात येते.
- **टीप : माती परिक्षण अहवालानुसार सदरच्या खत नियोजनामध्ये बदल करू शकता तसेच सेंद्रीय कर्ब वाढविण्यासाठी पेंडी व शेणखताचा वापर करावा.**





USK
AGRO
Sciences

Thank You!



USK AGRO SCIENCES

The Company Growing With The Growers



+91 9168691570



www.uskagrosciences.com



uskagrosciences@gmail.com



Vishrambag, Sangli