

 2025

हरभरा पिक नियोजन



युएसके अॅग्रो
सायन्सेस



Website
www.uskagrosiences.com



Phone
+91 9168691570

जमीन :

मध्यम ते भारी काळी कसदार व चांगल्या निचऱ्याची जमीन निवडावी.

पेरणीची वेळ :

- जिरायती - २५ सप्टेंबरनंतर
- बागायती - २० ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर

बीजप्रक्रिया :

पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास २ ग्रॅम थायरम + २ ग्रॅम बाविस्टीन यांची बीजप्रक्रिया करावी.

खत व्यवस्थापन :

पेरणीचे वेळी हरभरा पिकास खालीलप्रमाणे प्रति एकरी खते द्यावीत.

डी.ए.पी. ५० किलो + म्युरेट ऑफ पोटॅश २० किलो + एस.आर.पी. ९९ किलो + मॅक्सवेल - एस ५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो

फवारणी व्यवस्थापन :

पेरणीनंतर २०-२५ दिवसांनी वाढीसाठी तसेच शेंगा पोखरणान्या अळीच्या (हेलिकोवर्पा) नियंत्रणासाठी खालील फवारणी घ्यावी.

पाणी १०० ली. + हंस २०० मिली + १९:१९:१९ २५० ग्रॅम + स्लोगन ४० ग्रॅम + क्लोरो ५०% १५० मिली + स्ट्रॉबेरी १०० ग्रॅम + स्टिकफोर १०० मिली.





पेरणीनंतर ३०-३५ दिवसांनी बुरशीजन्य रोग, किड नियंत्रणासाठी तसेच चांगल्या वाढीसाठी खालील फवारणी घ्यावी.

पाणी १०० ली + स्टारफोर्स २५० मिली + क्लोरो ५०% १५० मिली + झेड-७८ २०० ग्रॅम + १३:००:४५ २५० ग्रॅम + हिन्ट १५० मिली.




फुलकळीचे प्रमाण वाढण्यासाठी तसेच दाणे भरताना खालील फवारणी घ्यावी.

पाणी १०० ली + आयकॉन शार्डन १०० मिली + १३:००:४५ २०० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी १०० ग्रॅम + सि.बी.झेड-५० १०० ग्रॅम + हिन्ट २०० मिली + किटनाशक.



टीप :

माती परिक्षण अहवालानुसार सदरच्या खत नियोजनामध्ये बदल करू शकता तसेच सेंद्रीय कर्ब वाढविण्यासाठी पेंडी व शेणखताचा वापर करावा.



 2025

तूर पिक नियोजन



युएसके अॅग्रो
सायन्सेस



Website
www.uskagrosiences.com



Phone
+91 9168691570



जमीन :

मध्यम ते भारी, पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी जमीन तूर पिका करिता योग्य असते.

वाण :

आय. सी. पी. एल ८७, ए.के.टी- ८८११, बी.एस.एम.आर. ८५३, बी.एस.आर.-७३६, विपुला.

पेरणीची वेळ :

जुनच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात पेरणी करावी.

बीजप्रक्रिया :

पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास २ ग्रॅम थायरम + २ ग्रॅम सि.बी.झेड. -५० यांची बीजप्रक्रिया करावी.

खत व्यवस्थापन :

पेरणीचे वेळी तूर पिकास खालीलप्रमाणे प्रति एकरी खताचा डोस द्यावा.
डि.ए.पी. ५० किलो + एस.आर.पी. ९९ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो मॅग्नेशियम सल्फेट १० किलो +
ह्युमिफोर-जी १० किलो.



फवारणी व्यवस्थापन :

पेरणीनंतर ३०-३५ दिवसांनी बुरशीजन्य रोग व रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी तसेच चांगल्या वाढीसाठी खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी
पाणी १० ली + हंस २० मिली + एस.आर.पी. २० ग्रॅम + सि.बी.झेड. - ५०
१० ग्रॅम + स्लोगन ४ ग्रॅम



तुरीमध्ये फुलकळीचे प्रमाण वाढण्यासाठी तसेच सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.

पाणी १० ली. + आयकॉन शार्डन १० मिली + सुपरस्टार-९ १५ मिली + क्लोरो ५०% १५ मिली + सी.बी.झेड-५० - १५ ग्रॅम



शेंगामध्ये दाणे भरताना खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.

पाणी १० ली + हंस २५ मिली किंवा अॅमिनोलाईट २५ मिली + समरूप ००:५२:३४ ३० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी / स्प्रेवेल १० ग्रॅम + किटनाशक + हिन्ट १५ मिली.



Thank You



USK AGRO SCIENCES

The Company Growing With The Growers



**Our
Contact**



+91 9168691570



www.uskagrosciences.com



uskagrosciences@gmail.com



Vishrambag, Sangli