


2026

युएसके अॅग्रो सायन्सेस



आले पिक नियोजन



Phone
+91 9168691570



Website
www.uskagrosiences.com




बीज प्रक्रिया करण्यासाठी प्रमाण

- पाणी १०० ली + सि.बी. झेड-५०: २०० ग्रॅम + सुदामा ५० मिली + ह्युमिफोर / हंस २०० मिली
- वरील तयार केलेल्या द्रावणात आल्याचे बियाणे १०-१५ मिनिटे बुडवून लागणीसाठी वापरावे. यामुळे कंदकुज नियंत्रित होते व उगवण क्षमता वाढण्यास मदत होते.
- **लागणीवेळी खतांचा डोस प्रति एकर**
- १०:२६:२६-४ बॅग + दुय्यम अन्नद्रव्ये २ बॅग फोरेट-जी ७ किलो + एसआरपी ९: १ बॅग किंवा मॅक्सवेल-एस ५ किलो निंबोळी पेंड ५ बॅग + न्यूट्री पंच १० किलो
- **लागणीनंतर २५,४५ व ५० दिवसांनी खालीलप्रमाणे ट्रेचिंग किंवा आळवणी द्यावी.**
- २५ दिवसांनी पाणी १०० ली
- सि.बी. झेड-५० : २०० ग्रॅम + सुदामा ५० मिली + समरूप ह्युमिफोर / हंस ३०० मिली + १९:१९:१९-३०० ग्रॅम (पूर्ण उगवण झाल्यानंतर पहिले ट्रेचिंग करावे)
- हळदीमध्ये कंदकूज झाल्यास रुटगार्ड -२.५ मिली + सिलीस्टीक ०.२५ मिली घेवून ट्रेचिंग करावे व यानंतर १५-२० दिवसांनी दुसरे ट्रेचिंग करावे.
- ४५ दिवसांनी पाणी १०० ली रामबाण ३०० मिली/ ब्लुफोर २५० ग्रॅम + सुदामा ५० मिली.
- ५० दिवसांनी पाणी १०० ली + १३:४०:१३-५०० ग्रॅम + हंस ३०० मिली + मॅक्सवेल डि एफ ३०० मिली.
- (वरील ट्रेचिंग / आळवणी केल्यामुळे पांढरी मुळी वाढते, पिकाची वाढ चांगली होते तसेच कंदमाशी व कंदकूज यांना अटकाव होतो.)
- लागणीनंतर एका महिन्याने हंस १ ली. १९:१९:१९-३ किलो + सुदामा ७५० मिली + ब्लूफोर १ किलो ड्रीपमधून द्यावे.



भरणी व्यवस्थापन

- पहिली भरणी लागणीनंतर ७०-७५ दिवसांनी (२-२.५ महिने) खालील खते घालून करावी.
- डी.ए.पी. ५ बॅग पोटॅश २ बॅग मॅग्नेशियम सल्फेट २५ किलो + गंधक १० किलो + एस.आर.पी. ९ १ बॅग निंबोळी पेंड ५ बॅग + मॅक्सवेल-एस ५ किलो किंवा न्यूट्रीपंच १० किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो + फोरेट-जी ७ किलो प्रति एकर द्यावे.
- दुसरी भरणी लागणीनंतर ४ ते ४.५ महिन्यांनी खालीलप्रमाणे करावी.
- डी.ए.पी. ३ बॅग पोटॅश २ बॅग मॅग्नेशियम सल्फेट २५ किलो + गंधक १० किलो + एसआरपी ९ १ बॅग निंबोळी पेंड ३ बॅग + मॅक्सवेल-एस ५ किलो किंवा न्यूट्रीपंच १० किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो + फोरेट ५ किलो प्रति एकरी द्यावे.
- फुटव्यांची संख्या वाढविण्यासाठी अॅमिनोलाईट १ लिटर/एकर ट्रिपमधून द्यावे. व दोन दिवसांनी मॅक्सवेल डिएफ १ ली + फुलविलाईट ५०० ग्रॅम + सिलिस्टिक २०० मिली/ एकर ट्रिपमधून द्यावे.





फवारणी व्यवस्थापन



- लागणीनंतर २५-३० दिवसांनी **करपा व पाने खाणारी व गुंडाळणारी अळी नियंत्रणासाठी** खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली. सी. बी. झेड-५०:२०० ग्रॅम + हंस २०० मिली + सुदामा ५० मिली + स्ट्रॉबेरी / स्प्रेवेल १०० ग्रॅम + स्टिकफोर १०० मिली. किंवा पाणी १०० ली + सिफॉन १५० मिली + सिलिस्टीक ३० मिली
- लागणीनंतर ४० दिवसांनी **करपा व रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी** खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली + सुदामा ५० मिली + ब्लुफोर १५० ग्रॅम
- **करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी** फवारणी सिफॉन १५० मिली + सिलिस्टिक ३० मिली + पाणी १०० ली. (सदरच्या द्रावणामध्ये कोणतेही बुरशीनाशक, किटकनाशक किंवा मायक्रोन्युट्रीयंट मिसळू नये)
- लागणीनंतर ५० दिवसांनी **अळी, पानावरील चट्टे यांच्या नियंत्रणासाठी** तसेच सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली. + स्लोगन ४० ग्रॅम क्लोरो ५०% १५० मिली + यु.एस. झायटॉप २५० मिली + एस. आर. पी. २०० ग्रॅम + स्प्रेवेल १५० ग्रॅम + स्टारफोर्स २०० मिली.



- लागणीनंतर ८०-८५ दिवसांनी **करपा व रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी** तसेच सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली. + **मेटॅलॅक्झील ८%** + **मॅन्कोझेब ६४%** २०० ग्रॅम + **स्लोगन ४०** ग्रॅम **एस.आर.पी २००** ग्रॅम + **स्ट्रॉबेरी १००** ग्रॅम
- लागणीनंतर ९०-१०० दिवसांनी खालील फवारणी **करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी** घ्यावी.
- पाणी १०० ली + **रामबाण २००** मिली + **झेड-७८**: २०० ग्रॅम किंवा पाणी १०० ली **सिफॉन १५०** मिली + **सिलिस्टिक ३०** मिली
- लागणीनंतर ११० दिवसांनी आले लागू नये म्हणून ड्रिपमधून **रामबाण ३** ली. + **एस.आर.पी. ९** : ४.५ किलो प्रति एकर द्यावे.
- लागणीनंतर १२०-१३० दिवसांनी ड्रीपमधून प्रति एकर **१२:६१:००** ७ किलो **रुटशार्ईन ५००** ग्रॅम + **मॅक्सवेल- एस १** किलो १० दिवसाच्या अंतराने ४ वेळा **पांढरी मुळी वाढण्यासाठी तसेच सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी** द्यावे.
- आल्याच्या कुडीचे **वजन वाढविण्यासाठी** तसेच **गुणवत्ता सुधारण्यासाठी** १८०-२०० दिवसांनी **००:५२:३४-७** किलो + **एस.आर.पी.९** : २ किलो प्रति एकर १० दिवसाच्या अंतराने २५० दिवसांपर्यंत ड्रिपमधून द्यावे.





- **कॅलस्ट्रोक मिल्की** ६ महिन्यांनंतर एकरी २ ली ड्रिपमधून द्यावे. लागणीनंतर १५०-२०० दिवसांनी फुटव्यांची संख्या वाढविण्यासाठी व रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली + ००:५२:३४-४०० ग्रॅम + स्टारफोर्स २०० मिली + सायमो / (सायमोक्झीनील ८% + मॅन्कोझेब ६४%) २०० ग्रॅम + स्लोगन ४० ग्रॅम + डायक्लोरोव्हास १०० मिली.
- **करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी व तसेच कॅल्शियमच्या पुरवठ्यासाठी खालील फवारणी घ्यावी:**
- १०० ली पाणी + सुमॅक २०० मिली + ००:००:५०-२०० ग्रॅम + सि.बी.झेड-५०:२०० ग्रॅम
- (सु-मॅक मध्ये असलेल्या चिटोसानमुळे आले पिकास **ऑर्गॅनिक कॅल्शियम** मिळतो. त्यामुळे पाने रसरशीत व हिरवीगार राहतात त्यामुळे अन्नसाठा वाढून कंदाचे पोषण होते)
- (आले लागल्यास **ब्लुफोर** २५० ग्रॅम + **पेनिट्रेटर** ३०० मिली + **मेटॅलॅक्झील** २०० ग्रॅम + **सुदामा** ५० मिली प्रति १०० ली पाण्यातून ट्रेचिंग करावे व ५ दिवसांनी **रामबाण** ५०० मिली + **एस.आर.पी.** २०० ग्रॅम प्रति १०० ली पाण्यातून ट्रेचिंग करावे.)
- **टीप :** आले काढणीअगोदर ३ आठवडे ००:००:५० १० किलो + **एस.आर.पी -९** ४.५ किलो ड्रिपमधून ८-१० दिवसांच्या अंतराने २ वेळा द्यावे. यामुळे **आल्याचे वजन वाढते व गुणवत्ता सुधारते.**
- **टीप :** माती परिक्षण अहवालानुसार शेड्युलमध्ये दिलेल्या अन्नद्रव्यांचे वर्गीकरण करून त्यानुसार खतांची मात्रा द्यावी. तसेच शेणखत व पेंडीचा वापर सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यासाठी करावा.

THANK YOU



USK AGRO SCIENCES

The Company Growing With The Growers



Phone Number:

+91 9168691570



Website:

www.uskagrosciences.com



Location:

Vishrambag, Sangli



Email Address:

uskagrosciences@gmail.com